



โรคติดเชื่อไวรัสซิกา

ในประเทศไทย



“โรคติดเชื่อไวรัสซิกา”

สามารถพบได้ในประเทศไทย เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ

เพราะมียุงลายเป็นพาหะนำโรค

แต่

ยังไม่มี รายงาน
การระบาดใหญ่
ในประเทศไทย



พบผู้ป่วยประปราย ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะ
พื้นที่เขตชุมชนเมือง เนื่องจากมีประชากรหนาแน่น
และมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายพันธุ์ของยุงลาย
เช่น ชยะ เชนภาชนะที่มีน้ำขัง



สามารถป้องกันได้
โดยการควบคุม
ลูกน้ำยุงลายให้ลดลง
และร่วมกัน
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ปี 2560 มีรายงานผู้ป่วย 403 ราย
โดยเกือบทั้งหมดหายเป็นปกติแล้ว

มาตรการ
3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
กำจัดยุงลาย

เจ้าจริง
ให้ยุงสิ้นสาย